



بروس فاك® (جرعة كاملة)

لقاح مجفد معلق للحقن

لقاح حي مضعف لبروسيللا ميلاتنسيس عترة Rev.1

إحتياطات خاصة للتخلص من بقايا

اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبي بيطري غير مستخدم أو مواد نفايات مشتقة من هذا المنتج الطبي البيطري وفقاً للمتطلبات المحلية.

معلومات إضافية:

مرض البروسيللا هو مرض بكتيري مشترك بين الإنسان والحيوان مسجل في بلدان عديدة في العالم يصيب المرض الأغنام والماعز ويسبب الإجهاض والتهاب الخصيتين والمفاصل بالإضافة إلى التهاب الغدد التناسلية. أفضل طريقة للسيطرة على المرض هو التحصين الدوري.

تميز اللقاح بالخصائص التالية:

- الثبات.
- لا يتسبب بتفاعلات موضعية أو عامة.
- يوفر مناعة كافية لعدة سنوات ضد مرض الإجهاض المعدي.
- يوفر التلقيح إستجابة مناعية جيدة.

التعبئة:

زجاجات سعة: ١٠ جرعات، ٢٥ جرعة، ٥٠ جرعة.

الإستخدام البيطري فقط.

فترة السحب:

- اللحم: ٢١ يوم.
- الحليب: ٢١ يوم.

إحتياطات التخزين الخاصة:

- يحفظ في الثلاجة (٢م° - ٨م°).
- يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- يمنع تجميده.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح: ١٨ شهر من تاريخ الإنتاج.
- صلاحية اللقاح بعد اذابة اللقاح: يستخدم اللقاح المذاب فوراً (خلال ساعتين في ظروف باردة).

تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأصناف المستهدفة:

تحصين الحيوانات السليمة فقط.

إحتياطات خاصة للإستخدام في الحيوانات:

غير قابل للتطبيق.

الإحتياطات الخاصة التي يجب أخذها الشخص

الذي يقوم بحقن الحيوانات:

اللقاح يسبب مرض للإنسان لذا يجب الإبتباه من الحقن الخاطئ أو فرك العين أثناء العمل.

يجب أخذ المشورة الطبية في حالة التعرض العرضي للقاح

الإستخدام خلال فترة الحمل، الرضاعة، الخصوبة:

يجب توخي الحذر عند تحصين الحيوانات الحوامل.

التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى

وأشكال التفاعل الأخرى:

عدم إعطاء مضادات حيوية ٧ أيام قبل

التحصين.

الجرعة الزائدة:

في حال حقن ١٠ أضعاف التركيز العالي من

جرعة اللقاح المعتمدة:

نادرة: من الممكن حدوث إجهاض إذا أعطيت للحيوانات الحوامل في المرحلة النهائية من

الحمل في ظروف مجهدة.

إذا لاحظت أي آثار جانبية، يرجى إبلاغ الطبيب

البيطري. احتمال حدوث تفاعل طفيف في

موضع الحقن.

بيان المادة الفعالة والمكونات

الأخرى:

المادة الفعالة:

- تحتوي كل جرعة من اللقاح المجفد على ٠,٥ - ١,٠ x 10^٩ CFU من بكتيريا البروسيللا ميلاتنسيس المضعف المحضر من عترة Rev.1.
- المكونات الأخرى: تريبنون، سكروز، صوديوم غلوتاميت.

الإستبيطات:

يعطي لقاح بروس فاك (جرعة كاملة) لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض الإجهاض المعدي.

ي

مخاطر الإستخدام:

يمنع تحصين الحيوانات المريضة أو المجهدة.

ردود الفعل السلبية:

نادرة جداً: من الممكن حدوث إجهاض إذا أعطيت للحيوانات الحوامل في المرحلة النهائية من الحمل في ظروف مجهدة. إذا لاحظت أي آثار جانبية، يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

الأصناف المستهدفة:

الأغنام والماعز.

الجرعة:

احقن جرعة واحدة (١ مل) لكل حيوان (من الإناث فقط لحديثي الولادة من الأغنام والماعز) تحت الجلد في منطقة تحت الإبط للأطراف الأمامية الخالية من الشعر على عمر أكبر من ٣ أشهر وقبل البلوغ.

طريقة الإستخدام:

- يحضر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة ومعقمة خالية من المطهرات.
- يذاب قرص اللقاح المجفد في المذيب المعقم المرفق مع اللقاح فوراً قبل الإستخدام.
- يذاب قرص اللقاح المجفد في المذيب المعقم المرفق مع اللقاح (١٠ مل لكل زجاجة لقاح ١٠ جرعات، ٢٥ مل لكل زجاجة لقاح ٢٥ جرعة، ٥٠ مل لكل زجاجة لقاح ٥٠ جرعة).

إسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccen.com, www.jovaccen.com

Jovac