



بروس فاك® (جرعة مخفضة)

لقاح مجفد معلق للحقن

لقاح حي مضعف لبروسيلاميلاتنسيس عترة Rev.1

بيان المادة الفعالة والمكونات

الأخرى:

- المادة الفعالة:
- تحتوي كل جرعة من اللقاح المجفد على ٠.٠٠٥ x ١٠^٥ CFU من بكتيريا البروسيلاميلاتنسيس المضعف المحض من عترة Rev.1.
- المكونات الأخرى:
- تريبتون، سكروز، صوديوم غلوتاميت.

الإستبياتبات:

يعطي لقاح بروس فاك (جرعة مخفضة) لتحسين الأغنام والماعز ضد مرض الإجهاض المعدى.

مخاطر الإستخدام:

يمنع تحصين الحيوانات المريضة أو المجهدة.

ردود الفعل السلبية:

نادرة جدا: من الممكن حدوث إجهاض إذا أعطيت للحيوانات الحوامل في المرحلة النهائية من الحمل في ظروف مجهدة. إذا لاحظت أي آثار جانبية ، يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

الأصناف المستهدفة:

الأغنام والماعز.

الجرعة:

- احقن جرعة واحدة لكل حيوان (١ مل)
- تحت الجلد في منطقة تحت الإبط للأطراف الأمامية الخالية من الشعر) على عمر ٣ شهور أو أكبر.
- يتم إعادة التحصين مرة أخرى سنويا.

طريقة الإستخدام:

- يحضر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة ومعقمة خالية من المطهرات.
- يذاب قرص اللقاح المجفد في المذيب المعقم المرقق مع اللقاح فوراً قبل الإستخدام.
- يستخدم ٥٠ مل من المذيب لكل ٥٠ جرعة ١٠٠ مل من المذيب لكل ١٠٠ جرعة من اللقاح.

معلومات إضافية:

- مرض البروسيلاميلاتنسيس هو مرض بكتيري مشترك بين الإنسان والحيوان مسجل في بلدان عديدة في العالم يصيب المرض الأغنام والماعز ويسبب الإجهاض والتهاب الخصيتين والمفاصل بالإضافة إلى التهاب الغدد التناسلية. أفضل طريقة للسيطرة على المرض هو التحصين الدوري.
- يتميز اللقاح بالخصائص التالية:
- الثبات.
- لا يتسبب بتفاعلات موضعية أو عامة.
- يوفر مناعة كافية لعدة سنوات ضد مرض الإجهاض المعدى.
- يوفر التلقيح إستجابة مناعية جيدة.

فترة السحب:

- اللحم: ٢١ يوم.
- الحليب: ٢١ يوم.

إحتياجات التخزين الخاصة:

- يحفظ في التلاجة (٢م^٢ - ٨م^٢).
- يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.
- يمنع تجميده.
- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح: ١٨ شهر من تاريخ الإنتاج.
- صلاحية اللقاح بعد اذابة اللقاح: يستخدم اللقاح المذاب فوراً (خلال ساعتين في ظروف باردة).

تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأصناف

المستهدفة:

تحصين الحيوانات السليمة فقط.

إحتياجات خاصة للإستخدام في الحيوانات:

غير قابل للتطبيق.

الإحتياجات الخاصة التي يجب أخذها الشخص الذي يقوم بحقن الحيوانات:

اللقاح يسبب مرض للإنسان لذا يجب الإبتياه من الحقن الخاطى أو فرك العين أثناء العمل. يجب أخذ المشورة الطبية في حالة التعرض العرضي للقاح

الإستخدام خلال فترة الحمل، الرضاعة، الخصوبة:

يجب توخي الحذر عند تحصين الحيوانات الحوامل.

التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى

وأشكال التفاعل الأخرى:

عدم إعطاء مضادات حيوية ٧ أيام قبل التحصين.

الجرعة الزائدة:

نادرة جدا: من الممكن حدوث إجهاض إذا أعطيت للحيوانات الحوامل في المرحلة النهائية من الحمل في ظروف مجهدة. إذا لاحظت أي آثار جانبية ، يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

إحتياجات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبي بيطري غير مستخدم أو مواد نفايات مشتقة من هذا المنتج الطبي البيطري وفقاً للمتطلبات المحلية.

إسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccencenter.com, www.jovaccencenter.com

Jovac