



كومبي فاك®

لقاح حي مجفد مكون من فيروس نيوكاسل
وفيروس مرض التهاب الشعب الهوائية المعدي

بيان المادة الفعالة والمكونات الأخرى:

تحتوي كل جرعة من اللقاح المجفد على:

- المادة الفعالة:
- على الأقل على $10^{7.0}$ EID₅₀ من فيروس مرض نيوكاسل المضعف المحضر من عترة B1،
- على الأقل على $10^{7.0}$ EID₅₀ من فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي المضعف المحضر من عترة H120.
- المكونات الأخرى:
لاكتوز، حليب مجفد خالي الدسم.

الإستبيبات:

يعطي لقاح كومبي فاك لتحصين الدواجن ضد مرض نيوكاسل و التهاب الشعب الهوائية المعدي.

مخادير الإستخدام:

يمنع تحصين الطيور المريضة أو المجهدة.

ردود الفعل السلبية:

نادرة جداً؛ أعراض تنفسية طفيفة تختفي في غضون أيام قليلة.
إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

النوع المستهدف:

الدواجن.

الجرعة وطريقة الإستخدام:

جرعة واحدة لكل طائر.

طريقة الإستخدام:

التقطير بالعين/ الأنف:

- يذاب اللقاح في محلول فيسيولوجي (30 مل).
- يعطى باستخدام قطارة معايرة، يقطر قطرة واحدة من اللقاح في عين واحدة أو فتحة أنفية واحدة من كل طير. يجب على الشخص الذي يقوم بحقن اللقاح عن طريق الأنف التأكد بأن نقطة اللقاح قد تم إستنشاقها من قبل الطير.
- تستخدم اللقاح فوراً بعد إذابته (خلال ساعتين في ظروف باردة).

بواسطة مياه الشرب:

- يحل اللقاح في ماء بارد ونظيف، خالي من المطهرات مع إضافة بودرة الحليب الخالي الدسم (2 غم / ل) لتثبيت فعالية اللقاح.
- يجب أن لا تزيد درجة ماء الشرب التي تحتوي على اللقاح على $20-25^{\circ}\text{C}$.
- ينصح أن تعطش الطيور قبل التحصين، (1-2 ساعة).
- يعطى اللقاح في الصباح الباكر أو عندما يكون الطقس بارداً في الأيام الحارة.

يخفف اللقاح في كمية كافية من مياه الشرب بحيث تستهلك كامل الكمية خلال ساعة إلى ساعتين

حسب عمر الطيور وطبيعة الجو على النحو التالي:

- عمر 1-7 أيام
- يخفف اللقاح 1000 جرعة في 5 لتر ماء
- عمر 7-14 أسبوع
- يخفف اللقاح 1000 جرعة في 10 لتر ماء
- عمر 4-8 أسابيع
- يخفف اللقاح 1000 جرعة في 20 لتر ماء
- عمر 8 أسابيع فما فوق
- يخفف اللقاح 1000 جرعة في 40 لتر ماء

بواسطة الرش الرذاذي:

- يرش اللقاح فوق الطيور عن بعد 20-40 سم مستعملاً مرشاً ضاغظاً مناسباً يولد رشا خشناً.
- تستعمل الطيور وتغلق النوافذ والمراوح والمفاتيح والإضاءة في الحظائر خلال عملية الرش ويعاد فتحها وتشغيلها بعد الرش بعشرة دقائق.
- الكمية الكافية من الماء المقطر لكل 1000 جرعة هي كما يلي:

- الأسبوع الأول من عمر الطيور 200 مل
- أسبوعين من العمر 200 مل
- 4 أسابيع من العمر 400 مل

نصائح طريقة الإستخدام:

- يحضر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة ومعقمة خالية من المطهرات.
- عند الحقن بواسطة مياه الشرب تعطش الطيور لمدة 2-1 ساعة قبل التحصين عن طريق مياه الشرب.
- يجب إعطاء اللقاح للطيور خلال ساعتين بعد إذابة اللقاح.

فترة السحب:

صفر يوم.

إحتياطات التخزين الخاصة:

- يحفظ مبرداً (2-8°C).
- يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح: سنتان من تاريخ الإنتاج.
- يجب إستخدام اللقاح خلال ساعتين بعد إذابة اللقاح.

تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأنصاف

المستهدفة:

تحصين الطيور السليمة فقط.

إحتياطات خاصة للإستخدام في الحيوانات:

غير قابل للتطبيق.

الإحتياطات الخاصة التي يجب أخذها الشخص

الذي يقوم بحقن الحيوانات:

اللقاح لا يسبب مرض للإنسان. في حال لامس اللقاح

العين ينصح غسل العين بالماء جيداً.

إسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenr.com, www.jovaccenr.com

Jovac