



جالوفاك 9R®

لقاح حي مجفد للحقن مكون من سالمونيلا جالينيرم 9R

بيان المادة الفعالة والمكونات الأخرى:

- المادة الفعالة:
- تحتوي كل جرعة من اللقاح المجفد على الأقل على 2×10^8 CFU من بكتيريا سالمونيلا جالينيرم المحضر من عترة (9R).
- المكونات الأخرى:
- سيروم المصل البقري، سكروز، جلوتامات الصوديوم.

الإستنباتات:

يعطى لقاح جالوفاك 9R لإعطاء مناعة مكتسبة للدجاج البياض والأمهات ضد سالمونيلا جالينيرم (تيفونيد الدواجن) / بلورم وجزئيا ضد سالمونيلا انترتيدس.

مخاذه الإستخدام:

- يمنع تحصين الطيور المريضة أو المجهدة.

ردود الفعل السلبية:

نادرة جدا، قد تظهر ندبة صغيرة في مكان الحقن كردة فعل للقاح ولكنها تزول لاحقا. إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

الأصناف المستهدفة:

الدواجن.

الجرعة:

- الجرعة: يحقن ٠.٢ مل من اللقاح بعه دله تحت الجلد في أسفل الرقبة من الخلف.
- التحصين الأولي: على عمر ٦-٨ أسابيع.
- التحصين الثاني: على عمر ١٤-١٦ أسبوع.

نصائح طريقة الإستخدام:

- استخدم إجراءات التعقيم المعتادة.
- يحضر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة ومعقمة خالية من المظهرات.
- يداب قرص اللقاح المجفد في المذيب المعقم الخاص باللقاح.
- يستخدم ١٠٠ مل من المذيب لكل ٥٠٠ جرعة من اللقاح أو ٢٠٠ مل من المذيب لكل ١٠٠٠ جرعة من اللقاح.
- يحضر اللقاح بإضافة ٢ مل من المحلول الى اللقاح المجفد، يخلط جيدا ثم ينقل الى زجاجة المحلول.
- يستخدم اللقاح المذاب فوراً (خلال ساعتين في الظروف الباردة).
- عدم تعريض الدواجن إلى الإصابة بالمرض لمدة ١٤ يوم بعد التحصين لإعطاء المدة الكافية لتكوين المناعة.

فترة السحب:

صفر يوم.

إحتياجات التخزين الخاصة:

- يحفظ مبردا (٢م° - ٨م°).
- يمنع تجميده.
- يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.
- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- يجب إستخدام اللقاح خلال ساعتين بعد اذبة اللقاح.
- صلاحية اللقاح: ١٨ شهر من تاريخ الإنتاج.

تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأصناف

المستهدفة:

تحصين الدواجن السليمة فقط.

إحتياطات خاصة للإستخدام في الحيوانات:

غير قابل للتطبيق.

الإحتياطات الخاصة التي يجب أخذها الشخص

الذي يقوم بحقن الحيوانات:

اللقاح لا يسبب مرض للإنسان ولكن يجب الإلتباه من الحقن العرضي.

في حالة حدوث الحقن العرضي، عليك مراجعة الطبيب.

الإستخدام خلال فترة الوضع، الخصوبة:

لا تحصن دجاج الأمهات والبيض قبل اسبوعين وأثناء فترة إنتاج البيض.

من الممكن التحصين أثناء فترة إنتاج البيض في المناطق عالية الخطورة.

التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى

وأشكال التفاعل الأخرى:

عدم إعطاء مضادات حيوية ٧ أيام قبل التحصين

الجرعة الزائدة:

في حال حقن ١٠ أضعاف التركيز المعتمد من اللقاح؛ نادرة، قد تظهر ندبة صغيرة في مكان الحقن كردة فعل للقاح ولكنها تزول لاحقا. إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

إحتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبي بيطري غير مستخدم أو مواد نفايات مشتقة من هذا المنتج الطبي البيطري وفقا للمتطلبات المحلية.

معلومات إضافية:

لقاح يحضر لقاح جالوفاك 9R من عترة سالمونيلا جالينيرم 9R للوقاية ضد مرض سالمونيلا جالينيرم (مرض تيفونيد الدواجن) والوقاية جزئيا من مرض سالمونيلا انترتيدس في الدجاج البياض والأمهات.

إسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenr.com, www.jovaccenr.com

Jovac