



جوفاك آي بي H120®

لقاح حي مجفد مكون من فيروس آي بي عترة H120

بيان المادة الفعالة والمكونات الأخرى:

- تحتوي كل جرعة من اللقاح المجفد على:
- المادة الفعالة:
- على الأقل على 10^{8.0} EID₅₀ من فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي المضعف المحضّر من عترة H120.
- المكونات الأخرى:
- لاكتوز، حليب مجفد خالي الدم.

الإستبيبات:

يعطي لقاح جوفاك آي بي لتحصين الدواجن ضد مرض التهاب الشعب الهوائية المعدي.

محاذير الإستخدام:

يمنع تحصين الطيور المريضة أو المجهدة.

ردود الفعل السلبية:

نادرة: أعراض تنفسية طفيفة تختفي في غضون أيام قليلة.
إذا لاحظت أي آثار جانبية، حتى تلك الغير مرجحة في هذه النشرة أو كنت تعتقد أن اللقاح لم يعطي النتائج المرجوة، يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

النوع المستهدف:

الدواجن.

الجرعة:

- الدجاج اللامح:
- التحصين الأولي على عمر يوم واحد.
- التحصين المعزز على عمر 4 - 20 يوم.
- الدجاج البياض:
- التحصين الأولي على عمر يوم واحد.
- التحصين المعزز الأول على عمر أسبوعين.
- التحصين المعزز الثاني على عمر 10 أسابيع.

طريقة التحصين:

التقطير (العين/الأنف):

- يذاب اللقاح في محلول فيسيولوجي (30 مل) ويعطى باستخدام قطارة معايرة. يقطر قطرة واحدة من اللقاح في عين واحدة أو فتحة أنفية واحدة من كل طير. يجب على الشخص الذي يقوم بحقن اللقاح عن طريق الأنف التأكد بأن نقطة اللقاح قد تم إستنشاقها من قبل الطير.
- استخدم اللقاح فوراً بعد إزديته (خلال ساعتين في ظروف باردة).

بواسطة مياه الشرب:

- يحل اللقاح في ماء بارد ونظيف، و خالي من المطهرات مع إضافة بودرة الحليب الخالي الدم (3 غم / ل) لتثبيت فعالية اللقاح.
- يجب أن لا تزيد درجة ماء الشرب التي تحتوي على اللقاح عن 20-10 م°.
- ينصح أن تعطش الطيور قبل التحصين، (1-2 ساعة).
- يعطى اللقاح في الصباح الباكر أو عندما يكون

الملقس باردا في الأيام الحارة.
يخفف اللقاح في كمية كافية من مياه الشرب بحيث تستهلك كامل الكمية خلال ساعة إلى ساعتين حسب عمر الطيور وطبيعة الجو على النحو التالي:

- عمر 4 - 10 أيام
- يخفف اللقاح 1000 جرعة في 10 لتر ماء
- عمر 3 - 4 أسابيع
- يخفف اللقاح 1000 جرعة في 20 لتر ماء
- عمر 3 شهور فما فوق
- يخفف اللقاح 1000 جرعة في 40 لتر ماء

بواسطة الرش الرذاذي:

- يرش اللقاح فوق الطيور عن بعد 30-40 سم
- مستعملا مرشا ضاغطا مناسباً بولد رشاً خشناً.
- تشر الطيور وتغلق النوافذ والمراوح والفتحات والإضاءة في الحظائر خلال عملية الرش ويعاد فتحها وتشغيلها بعد الرش بعشرة دقائق.
- الكمية الكافية من الماء المقطر لكل 1000 جرعة هي كما يلي:
- الأسبوع الأول من عمر الطيور 300 مل
- 2-4 أسابيع من العمر 400 مل
- الطيور البالغة 500 مل

نماذج طريقة الإستخدام:

- يحضر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة ومعقمة خالية من المطهرات.
- عند الحقن بواسطة مياه الشرب تعطش الطيور لمدة 1-2 ساعة قبل التحصين عن طريق مياه الشرب.
- يجب إعطاء اللقاح للطيور خلال ساعتين بعد إزديته اللقاح.
- يتم التخلص من عبوات اللقاح المفتوحة المتبقية والمواد المستخدمة باستخدام المطهرات المناسبة مثل (الفيونيكس، إيدوفور، أو الفورمالدهايد) حسب التركيز الموصى به.

فترة السحب:

صفر يوم.

إحتياجات التخزين الخاصة:

- يحفظ مبردا (2م°-8م°).
- يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح: سنتان من تاريخ الإنتاج.
- يجب إستخدام اللقاح خلال ساعتين بعد أذية اللقاح.

تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأنصاف

المستهدفة:

تحصين الطيور السليمة فقط.
إحتياجات خاصة للإستخدام في الحيوانات:
غير قابل للتطبيق.

إسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenr.com, www.jovaccenr.com

Jovac