



Jovaplasm B[®]

Vaccin vivant lipophilisé atténué contre le *Mycoplasma Mycoide* de la sous-espèce des Mycoïdes de petites colonies

La Pleuropneumonie bovine contagieuse (CBPP) est une maladie des bovins causée par la *Mycoplasma mycoide* de la sous-espèce des mycoïdes de petites colonies.

COMPOSITION:

Jovaplasm B est un vaccin vivant atténué lipophilisé de *Mycoplasma mycoide* de la sous-espèce des mycoïdes s petite clonie biotype T1/44.

Chaque dose (1 ml) contient au moins 10⁷ UCC de *Mycoplasma Mycoïdes* vivant atténué lyophilisé de la sous-espèce des mycoïdes biotype T1 / 44 de petites colonies.

CHARACTERISTICS:

Jovaplasm B présente les caractéristiques suivantes:

- Stable dans des conditions de stockage correctes.
- Fournit une protection satisfaisante depuis au moins un an contre la Pleuropneumonie contagieuse des bovins (PPCB).
- La vaccination est suivie par des réponses immunitaires démontrées par des anticorps spécifiques.

INDICATIONS:

Jovaplasm B est indiqué pour le prévention de la contagion bovine Pleuropneumonie (PPCB) chez les bovins.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION:

- La posologie est de 1 ml par voie sous-cutanée de l'animal; (de préférence dans la région sous la peau du cou juste devant les épaules pour les bovins).
- Utiliser 50 ml de diluant dans chaque flacon de vaccin à 50 doses et 100 ml de diluant dans un flacon de vaccin à 100 doses.
- Vacciner les animaux de 2 mois et plus de l'âge. Les Animaux sous Âgés de 2 mois sont vaccinés uniquement en cas d'épidémie signalée.
- La dose de rappel est prévue annuellement.
- Utiliser le vaccin immédiatement après reconstitution (dans un délai d' une heure dans des conditions fraîches).

DÉLAI D'ATTENTE:

Zéro jours.

CONTRE-INDICATIONS:

- Ne pas vacciner les animaux malades ou stressés.
- Ne pas utiliser d'antibiotiques ou d'autres substances antibactériennes pendant 7 jours avant et 14 jours après vaccination.
- Ne pas utiliser de diluants non réfrigérés.

MISES EN GARDE SPÉCIALES:

- Bien agiter avant utilisation.
- Ne pas utiliser de seringues et d'aiguilles nettoyyées ou stérilisées par les antiseptiques.

- Utiliser uniquement des matériaux propres, antiseptiques et exempts de désinfectant pour la préparation de la solution de vaccin.
- Le vaccin Jovaplasm B n'est pas pathogène pour l'homme; mais un soin particulier doit être pris pour éviter une injection accidentelle.
- Demander un avis médical en cas d'exposition accidentelle.
- Les Les flacons de vaccins ouverts non utilisés et les déchets doivent être décontaminés avec des désinfectants appropriés (phénols, iridophores ou formaldéhyde) à la concentration recommandée.

STOCKAGE ET CONSERVATION:

- Stable pendant 2 ans à -20° C ou 6 mois entre +2°C et +8°C.
- Protéger des direct rayons solaires.

PRESENTATION:

Flacons de 50 doses et de 100 doses.

POUR USAGE VÉTÉRIINAIRE SEULMENT.

Jovac

JORDAN BIOINDUSTRIES CENTER

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccnter.com, www.jovaccnter.com