



# ك & ب فاك®

لقاح حي مجعد للحقن من فيروس جدري الضأن والماعز الكيني (KSGP) عترة 0240 وفيروس طاعون المجترات الصغيرة عترة Nig.75/1.

التحكم بالمرض يعتمد على إجراءات الأمان الحيوي الشديدة وتلقيح الحيوانات المعرضة للإصابة (الماعز والأغنام).

كل جرعة من لقاح ك & ب فاك تتميز بالخصائص التالية:

- الثبات.
- مدة الحماية المناعية: يحقق مناعة كافية لمدة سنة واحدة ضد مرض جدري الضأن والماعز ومرض طاعون المجترات الصغيرة.
- يتحقق التلقيح استجابة مناعية جديدة.

**التعبئة:**  
زجاجات سعة: ٥٠ جرعة و ١٠٠ جرعة.

## للاستخدام البيطري فقط.

يحفظ بعيداً عنأشعة الشمس المباشرة.

يحفظ بعيداً عن منتقل الأطفال.

تحصين اللقاح: ستان من تاريخ الإنتاج.

يجب استخدام اللقاح خلال ساعتين بعد انتهاء اللقاح.

### تحذيرات خاصة:

#### تحذيرات خاصة كل نوع من الأصناف المستهدفة:

تحصين الحيوانات السليمة فقط.

#### احتياطات خاصة للاستخدام في الحيوانات:

غير قابل للتطبيق.

#### الاحتياطات الخاصة التي يجب اتخاذها الشخص الذي يقوم بحقن الحيوانات:

اللقاح لا يسبب مرض الإنسان ولكن يجب الإنتماء من الحقن العرضي.

في حالة حدوث الحقن العرضي، عليك مراجعة الطبيب.

#### الاستخدم خلال فترة الحمل، الرضاعة، الخصوبة:

يمكن استخدامه أثناء الحمل، الرضاعة، موسم التكاثر.

#### التفاعل مع المستدرارات الطبية الأخرى:

لا توجد معلومات متاحة حول سلامية وفعالية هذا اللقاح عند استخدامه مع أي منتج طبي بيطري آخر.

يجب اتخاذ إجراءات باستخدام هذا اللقاح قبل وبعد استخدام أي منتج طبي بيطري آخر كل حالة على حدة.

#### الجرعة الزائدة:

في حال حقن ١٠ أضعاف التركيز المعتمد من اللقاح:

نادراً قد تظهر نوبة مفقرة في مكان الحقن كردة فعل لللقاح ولكنها تزول ألاعا.

إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

#### احتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبي بيطري غير مستخدم أو مواد ثانية مترسبة من هذا المنتج الطبي البيطري وفقاً للمطالبات المحلية.

#### معلومات إضافية:

لقاح جدري الضأن والماعز مرض معدى جلدي خطير يسبب المجترات الصغيرة ويتسبّب بخسائر اقتصادية كبيرة للأعراض الخارجية هي وجود بثور على الجلد والأشتباه بالمتلازمة مع ارتفاع في درجة الحرارة، أما الأعراض الداخلية فهي التهاب رئوي وتهاب الغدد الليمفاوية والتي يؤدي إلى نفوق الحيوان. إن السيطرة على المرض هو التحصين باللقاح والرعاية الصحية للإقليم.

طاعون المجترات الصغيرة مرض معدى دسيب المجترات الصغيرة وتغيير عادة السلوكيات الأنفية والعينية والحمى التي يمكن أن تستمر ٥-٣ أيام، ويتميّز أيضاً بتقرّحات في الفم، إسهال والتهابات رئوية.

### بيان المادة الفعالة والمكونات الأخرى:

#### المادة الفعالة:

تحتوي كل جرعة من اللقاح المجعد على الأقل TCID<sub>50</sub> ٢٠٠ على فيروس جدري الضأن (KSGP) المضعف المحضر من عترة 0240 على الأقل على TCID<sub>50</sub> ٢٠٠، وعلى الأقل على Nig.75/1.

#### المكونات الأخرى:

حليب مجعد خالي الدسم، حليب مجعد خالي الدسم.

### الاستطبابات:

يعطي لقاح ك & ب فاك لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض جدري ومرض طاعون المجترات الصغيرة في الضأن والماعز.

### محاذير الاستخدام:

يمنع تحصين الحيوانات المريضة أو المجهدة.

### رود الفعل السلبية:

نادراً جداً قد تظهر نوبة صغيرة في مكان الحقن كردة فعل لللقاح ولكنها تزول ألاعا.

إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

### الأصناف المستهدفة:

#### الأغنام والماعز:

#### الجرعة:

الجرعة ١ مل لكل حيوان تحت الجلد، ويفضل في منطقة الإبط للأطراف الأمامية الخالية من الشعر على عمر ٣-٤ أشهر.

يتم إعادة التحصين مرة أخرى سنوياً.

### نصالع طريقة الاستخدام:

استخدم إجراءات التعقيم المعتادة.

يحضر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة ومعقمة.

خالية من المطهرات.

يذاب فرقس اللقاح المجعد في المذيب المعمق المرافق مع اللقاح.

يستدق ٥٠ مل من المذيب لكل ٥٠ جرعة من اللقاح أو ١٠٠ مل من المذيب لكل ١٠٠ جرعة من اللقاح.

يستدق اللقاح المذاب فوراً (خلال ساعتين في طرف باردة).

### فترقة السحب:

#### صفر يوم.

### احتياطات التخزين الخاصة:

يحفظ مبرداً (٣° - ٥° م).

### اسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenter.com, www.jovaccenter.com