



لمبي شيلد-ن®

لقاح حي مجفد للحقن من فيروس التهاب الجلد العقدي المضعف عترة نيثلينغ

بيان المادة الفعالة والمكونات الأخرى:

- المادة الفعالة:
- تحتوي كل جرعة من اللقاح المجفد (1 مل) على الأقل على ١٠٠ TCID₅₀ من فيروس التهاب الجلد العقدي المضعف المحضر من عترة نيثلينغ.
- المكونات الأخرى:
- باكتيروولوجيكال بيببتون، تريبولوز، حليب مجفد خالي النسم.

الإستيباتيات:

يعطي لقاح لمبي شيلد-ن لتحسين الأبقار ضد مرض التهاب الجلد العقدي في الأبقار.

مخاير الإستخدام:

يمنع تحصين الحيوانات المريضة أو المجعدة.

ردود الفعل السلبية:

- ندارة جدا:
- قد تظهر على الأبقار المحصنة تورم في مكان الحقن كردة فعل للقاح يخففي في غضون أيام قليلة.
- قد يحدث انخفاض مؤقت في إنتاج الحليب.
- إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

الأصناف المستهدفة:

الأبقار.

الجرعة:

- الجرعة ١ مل لكل حيوان تحت الجلد (ويفضل في منطقة الرقبة أمام الكتف مباشرة).
- تحصين الأبقار و حديثي الولادة من أمهات غير محصنة مسبقاً بجرعة واحدة على أي عمر.
- تحصين العجول من أمهات محصنة مسبقاً بهذا اللقاح على عمر ستة أشهر.
- تبدأ المناعة لدى الحيوان الملقح بعد ١٠ أيام ويكون لديه مناعة كافية بعد ثلاثة أسابيع.

نصائح طريقة الإستخدام:

- استخدم إجراءات التعقيم المعتادة.
- حضر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة ومعقمة خالية من المطهرات.
- يذاب قرص اللقاح المجفد في المذيب المعقم المرفق مع اللقاح.
- يستخدم ٢٥ مل من المذيب لكل ٢٥ جرعات من اللقاح، ٥٠ مل من المذيب لكل ٥٠ جرعة من اللقاح، ١٠٠ مل من المذيب لكل ١٠٠ جرعة من اللقاح.

- يستخدم اللقاح المذاب فوراً (خلال ساعتين في ظروف باردة).

فترة السحب:

صفر يوم.

إحتياطات التخزين الخاصة:

- يحفظ مبردا (٢-٨°م).
- يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح: سنتان من تاريخ الإنتاج.
- يجب إستخدام اللقاح خلال ساعتين بعد اذبة اللقاح.

تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأصناف

المستهدفة:

تحصين الحيوانات السليمة فقط.

إحتياطات خاصة للإستخدام في الحيوانات:

غير قابل للتطبيق.

الإحتياطات الخاصة التي يجب أخذها الشخص الذي يقوم بحقن الحيوانات:

اللقاح لا يسبب مرض للإنسان و لكن يجب الإنتباه من الحقن العرضي.

في حالة حدوث الحقن العرضي، عليك مراجعة الطبيب.

الإستخدام خلال فترة الحمل، الرضاعة، الخصوبة:

يمكن أن يستخدم خلال فترة الحمل، الرضاعة، موسم التكاثر.

التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى

وأشكال التفاعل الأخرى:

لا توجد معلومات متاحة حول سلامة وفعالية هذا اللقاح عند استخدامه مع أي منتج طبي بيطري آخر. يجب اتخاذ قرار باستخدام هذا اللقاح قبل أو بعد استخدام أي منتج طبي بيطري آخر كل حالة على حدة.

الجرعة الزائدة:

في حال حقن ١٠ أضعاف التركيز المعتمد من اللقاح:

- ندارة:
- قد تظهر على الأبقار المحصنة تورم في مكان الحقن كردة فعل للقاح يخففي في غضون أيام قليلة.
- قد يحدث انخفاض مؤقت في إنتاج الحليب.
- إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

إحتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبي بيطري غير مستخدم أو مواد نفايات مشتقة من هذا المنتج الطبي البيطري وفقاً للمتطلبات المحلية.

إسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovacceneter.com, www.jovacceneter.com

Jovac