



# انثرافاك®

لقاح معطل معلق للحقن  
مضاد لمرض الجمرة الخبيثة الحي عترة (ستيرن 34F2)

## بيان المادة الفعالة والمكونات الأخرى:

- كل ١ مل من اللقاح يحتوي على:
- المادة الفعالة:
  - ١٠ - ٢ x ١٠٠ CFU من لقاح الجمرة الخبيثة
  - السائل الحي المحضر من العترة الغير ممرضة (ستيرن 34F2) من البسيلاس أنتراسيس.
- المكونات الأخرى:
  - هيدروكسيد الألمنيوم: > ٤ ملغم / مل.

## الإستطبات:

- يستعمل هذا اللقاح ضد مرض الجمرة الخبيثة في الأبقار والجاموس والخيول والأغنام والماعز.
- بدء الإستجابة المناعية: بعد ٢١ يوماً.
- مدة الحماية المناعية: على الأقل سنة.

## محاذير الإستخدام:

- يمنع تحميم الحيوانات المريضة أو المجهدة.
- دم إعطاء مضادات حيوية ٧ أيام قبل التحصين و ١٤ يوم بعد التحصين.

## ردود الفعل السلبية:

- لا توجد.
- إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

## الأصناف المستهدفة:

- الأبقار والجاموس والخيول والأغنام والماعز.

## الجرعة:

- يحقن اللقاح تحت الجلد؛ ويفضل في منطقة الإبط للأطراف الأمامية الخالية من الشعر بالنسبة للأغنام والماعز ومنطقة الرقبة أمام الكتف مباشرة بالنسبة للأبقار والجاموس والخيول كالتالي:
- الأبقار والجاموس والخيول : ٣ مل
- الأغنام و الماعز : ١ مل
- التحصين الأولي:
- جرعة معتمدة واحدة على أي عمر (ويفضل على عمر اكبر من ٣ أشهر للعجول)، وتحصن الحيوانات مرة أخرى بعد ٦ شهور.
- التحصين المعزز: جرعة معتمدة واحدة سنوياً.

## طريقة الإستخدام:

- رج اللقاح جيداً قبل الإستخدام.
- استخدم إجراءات التعقيم المعتادة.
- تجنب إجهاد الحيوان عند التطعيم.

## فترة السحب:

- الطبيب: صفر يوم.
- للحم: ٢١ يوم

## التعبئة:

عبوات بلاستيكية سعة: ٥٠ مل، ١٠٠ مل.

## للإستخدام البيطري فقط.

## إحتياجات التخزين الخاصة:

- يحفظ مبردا (٢°م - ٨°م).
- يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- يمنع تجميده.
- يحفظ بعيداً عن تناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح بعد فتح العبوة: يجب إستخدام اللقاح خلال ٨ ساعات من فتح العبوة.
- صلاحية اللقاح: ٢ سنوات من تاريخ الإنتاج.

## تحذيرات خاصة:

### تحذيرات خاصة لكل نوع من الأصناف المستهدفة:

- تحصين الحيوانات السليمة فقط.
- إحتياطات خاصة للإستخدام في الحيوانات: غير قابل للتطبيق.

### الإحتياطات الخاصة التي يجب أخذها الشخص الذي يقوم بحقن الحيوانات:

- اللقاح لا يسبب مرض للإنسان ولكن يجب الإنتباه من الحقن العرضي.
- في حالة حدوث الحقن العرضي ، عليك مراجعة الطبيب.

### الإستخدام خلال فترة الحمل، الرضاعة، الخصوبة:

- يمكن أن يستخدم خلال فترة الحمل، الرضاعة، موسم التكاثر.

### التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى وأشكال التفاعل الأخرى:

- لا توجد معلومات متاحة حول سلامة وفعالية هذا اللقاح عند استخدامه مع أي منتج طبي بيطري آخر. يجب اتخاذ قرار باستخدام هذا اللقاح قبل أو بعد استخدام أي منتج طبي بيطري آخر كل حالة على حدة.

### الجرعة الزائدة:

- عند حقن جرعتين من جرعة اللقاح المعتمدة: لا توجد.
- إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

### إحتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:

- يجب التخلص من أي منتج طبي بيطري غير مستخدم أو مواد نفايات مشتقة من هذا المنتج الطبي البيطري وفقاً للمتطلبات المحلية.

### معلومات إضافية:

- لقاح معطل ضد مرض الجمرة الخبيثة في الأبقار والجاموس والخيول والأغنام والماعز.
- تستند تدابير الرقابة على أساس صارم من النظافة وتطعيم الحيوانات المعرضين للإصابة.
- لا ينبغي فتح الحيوانات النافقة المشتبته بها.
- الجمرة الخبيثة مرض حيواني المصدر ويجب على الأشخاص الذين على اتصال مباشر بالحالات المؤكدة طلب المساعدة الطبية.

### إسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccnter.com, www.jovaccnter.com

Jovac