



# جوفأ زيت ١،٢،٤®

لقاح زيتي معطل للحقن يحتوي على فيروس النيوكاسل  
وفيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي وفيروس  
متلازمة إنخفاض البيض ٧٦'

## بيان المادة الفعالة والمكونات الأخرى:

- يحتوي كل جرعة من اللقاح على:
  - المادة الفعالة قبل التعطيل:
  - على الأقل ١٠<sup>٨</sup>٦١ EID<sub>50</sub> من فيروس نيوكاسل عترة لاسوتا.
  - على الأقل ١٠<sup>٦</sup>٨١ EID<sub>50</sub> من فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي عترة M41.
  - على الأقل ١٠٠٠ HA Unit من فيروس لقاح متلازمة إنخفاض البيض ٧٦'.
- المكونات الأخرى:
  - سبان ٨٠، تويين ٨٠، ثايوميرسال، المادة المنشطة للمناعة.

## الإستطبيات:

إعطاء مناعة جيدة لللداج البياض ضد مرض النيوكاسل و التهاب الشعب الهوائية المعدي ومتلازمة إنخفاض البيض ٧٦'.

## محاذير الإستخدام:

يمنع تحصين الطيور المريضة أو المجردة.

## ردود الفعل السلبية:

نادرة: من الممكن حدوث تفاعل طفيف. إذا لاحظت أي آثار جانبية، يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

## النوع المستهدف:

الدواجن.

## الجرعة:

- إحقن جرعة واحدة لكل طير: ٠,٣ مل تحت الجلد في أسفل الرقبة من الخلف أو في عضلة الصدر أو الفخذ على عمر ١٥-١٦ أسابيع لللداج البياض.
- للحصول على مناعة جيدة يجب إعطاء لقاح حي لفيروس النيوكاسل ولقاح حي لفيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي قبل إعطاء اللقاح الميت الزيتي.

## نصائح طريقة الإستخدام:

- استخدم إجراءات التعقيم المعتادة.
- انتظر ليأخذ اللقاح درجة حرارة الغرفة قبل الاستعمال.
- رج العبوة جيدا قبل الاستعمال.

## فترة السحب:

صفر يوم.

## إحتياجات التخزين الخاصة:

- يحفظ مبردا (٣م<sup>٠</sup> - ٨م<sup>٠</sup>).
- يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.
- يمنع جمده.
- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح: سنتان من تاريخ الإنتاج.
- يجب إستخدام اللقاح خلال ٨ ساعات بعد فتح العبوة.

## تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأنصاف المستهدفة:

تحصين الطيور السليمة فقط.

إحتياطات خاصة للإستخدام في الحيوانات:

غير قابل للتطبيق.

الإحتياطات الخاصة التي يجب أخذها الشخص الذي يقوم بحقن الحيوانات:

اللقاح لا يسبب مرض للإنسان و لكن يجب الإلتباه من الحقن العرضي. في حالة حدوث الحقن العرضي، عليك مراجعة الطبيب.

الإستخدام خلال فترة وضع البيض، الخصوبة:

لا يستخدم خلال فترة إنتاج البيض.

التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى

وأشكال التفاعل الأخرى:

لا توجد معلومات متاحة حول سلامة وفعالية هذا اللقاح عند استخدامه مع أي منتج طبي بيطري آخر. يجب اتخاذ قرار باستخدام هذا اللقاح قبل أو بعد استخدام أي منتج طبي بيطري آخر كل حالة على حدة.

## الجرعة الزائدة:

إحتمال حدوث تفاعل طفيف في حال حقن ضعفي التركيز من جرعة اللقاح المعتمدة. إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

## إحتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبي بيطري غير مستخدم أو مواد نفايات مشتقة من هذا المنتج الطبي البيطري وفقاً للمتطلبات المحلية.

## إسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccen.com, www.jovaccen.com

Jovac