



جوفا زيت ا، ٣

لقاح زيتني معطل للحقن يحتوي على فيروس النيوكاسل وفiroس الجمبورو

احتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبي ببطرى غير مستخدم أو مواد تغابيات مشتبأة من هذا المنتج الطبي الببطرى وفقاً للمتطلبات المحلية.

معلومات إضافية:
للقاح معطل زيتني ثانوي. يتم تحضير الفيروس في أجنة وخلايا الدجاج الخالية من الأمراض (SPF) ويتم خلطه مع المواد المساعدة لإنتاج لقاح مستخلب.

التعبئة:
عبوات بلاستيكية سعة: ٣٠٠ مل (١ جرعة).

للإستعمال البيبطرى فقط.

- انتظر لياخذ اللقاح درجة حرارة الغرفة قبل الاستعمال.
- رج العبوة جيداً قبل الاستعمال.

فترقة السحب: صفر يوم

- احتياطات التخزين الخاصة:**
 - يحفظ مبرداً (-٢° -٨°).
 - يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
 - يمتنع تجميده.
 - يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
 - صلاحية اللقاح: سنتان من تاريخ الإنتاج.
 - يجب استخدام اللقاح خلال ٨ ساعات بعد فتح العبوة.

تحذيرات خاصة: تحذيرات خاصة لكل نوع من الأصناف المستهدفة:

تحسين الطيور السليمة فقط.

احتياطات خاصة للاستخدام في الحيوانات:

غير قابل للتطبيق.

الاحتياطات الخاصة التي يجب اتخاذها:
الشخص الذي يقوم بحقن الحيوانات:
اللقاح لا يسبب مرض الإنسان ولكن يجب الانتهاء من الحقن العرضي.
في حالة حدوث الحقن العرضي، عليك مراجعة الطبيب.

الإستخدام خلال فترة الوضع، الخصوبة:
يمكن أن يستخدم خلال فترة انتاج البيض.

التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى: وأشكال التفاعل الأخرى:

لا توجد معلومات متاحة حول سلامة وفعالية هذا اللقاح عند استخدامه مع أي منتج طبي ببطرى آخر. يجب اتخاذ قرار باستخدام هذا اللقاح قبل أو بعد استخدام أي منتج طبي ببطرى آخر كل حالة على حدة.

الجرعة الزائدة:
احتمال حدوث تفاعل طيفي في موضع الحقن في حال حقن ضعفين التركيز من جرعة اللقاح المعتمدة.

بيان المادة الفعالة والمكونات الأخرى:

- يحتوي كل (٣٠،٠ مل) من اللقاح على:
 - المادة الداعمة:
 - آن لا تقل نتيجة فحص من التلارزن فيروس نيووكاسل عترة لاستو المعمل.
 - على الأقل EID₅₀ ٨٦٠ من فيروس TCID₅₀ ١٠١٠ من فيروس الجمبورو عترة M1.
 - المكونات الأخرى:
 - سبان، توبين، ثايميرسال، المادة المنشطة للمناعة.

الإستخدامات:
لإعطاء مناعة جديدة للدواجن الأمهات ضد مرض النيوكاسل والجمبورو.

مماذير الإستخدام:
يمثل تحسين الطيور المريضة أو المجهدة.

ردود الفعل السلبية:
نادرة: حدوث تفاعل طيفي في موضع الحقن.
إذا لاحظت أي آثار جانبية، حتى تلك الغير مدرجة في هذه النشرة أو كنت تعتقد أن اللقاح لم يعطي النتائج المرجوة، يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

النوع المستهدف:
الدواجن.

الجرعة:

- التحصين: إحقن ٣،٠ مل لكل طير؛ تحت الجلد في أسفل الرقبة من الخلف أو في عضلة الصدر أو الفخذ في الأمهات على عمر ٢٠-١٦ أسبوع.
- الحصول على مناعة جديدة يجب إعطاء لقاح حي لفيروس النيوكاسل وفيروس الجمبورو قبل إعطاء اللقاح الميت الرئيسي.

نصائح طريقة الإستخدام:
• يحضر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة
ومعقمة خالية من الممهرات.

اسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenter.com, www.jovaccenter.com

Jovac