



# جوفا زيت ٦،١®

لقاح زيتني معطل للحقن يحتوي على فيروس النيوكاسل وفiroس الأدينو ذو النوع المصلبي ٤

## احتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبي بيطرى غير مستخدم أو مواد نفايات مشتبة من هذا المنتج الطبى البيطرى وفقاً للمطالبات المحلية.

## معلومات اضافية:

للقاح معلطل زيتى ثانى. يتم تحضير الفيروس في أجنة الدجاج الخارجى من الأمراض (SPF) وخلياً كبد أجنة الدجاج الخارجى من الأمراض (SPF) ويتم خلطه مع المواد المساعدة لإنتاج لقاح مستabil.

## التعبئة:

عبوات بلاستيكية سعة: ٥٠٠ مل.

## للإستعمال البيطري فقط.

## نصائح طريقة الإستخدام:

- يحضر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة وعقممة خالية من المطهرات.
- انتظر ليأخذ اللقاح درجة حرارة الغرفة قبل الاستعمال.
- رج العبوة جيداً قبل الاستعمال.

## فترة السحب:

صفر يوم.

## احتياطات التخزين الخاصة:

- يحفظ مبرداً (٢° - ٨°).
- يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- يمكن تجميد.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح: ستان من تاريخ الإنتاج.
- يجب استخدام اللقاح خلال ٨ ساعات بعد فتح العبوة.

## تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأصناف المستهدفة:

تحسين الطيور السليمية فقط.

## احتياطات خاصة لاستخدام في الحيوانات:

غير قابل للتطبيق.

## الاحتياطات الخاصة التي يجب أن تؤخذها الشخص الذي يقوم بحقن الحيوانات:

اللقاح لا يسبب مرض للإنسان ولكن يجب الإنبعاث من الحقن العرضي.

في حالة حدوث الحقن العرضي، عليك مراجعة الطبيب.

## الاستخدم خلال فترة الوضع، الخصوبة:

يمكن أن يستخدم خلال فترة انتاج البيض.

## التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى:

لا وجود معلومات متاحة حول سلامية وفعالية

هذا اللقاح عند استخدامه مع أي منتج طبى

بيطري آخر. يجب اتخاذ قرار باستخدام هذا

اللقاح قبل وبعد استخدام أي منتج طبى

بيطري آخر كل حالة على حدة.

## الجرعة الزائدة:

احتمال حدوث تفاعل طفيف في موقع الحقن في حال حقن ضعفين التركيز من جرعة اللقاح المعتمدة.

## بيان المادة الفعالة والمكونات

### الأخر:

يحتوى كل (٠،٢ مل) من اللقاح على:

- أن لا تقل نتيجة فحص منع التلارزن

فيروس نوكاسيل عترة لاستوتا المعطل.

- على الأقل  $8\times 10^{8}$  EID<sub>50</sub> من فيروس

الأدينو المعطل ذو النوع المصلبي ٤

موجة النافورة.

### المكونات الأخرى:

سيان، توبين، ثايميرسال، المادة

المنشطة للمناعة.

### الإستطبابات:

لا إعطاء مناعة جديدة للدواجن (اللحم والأمهات) ضد مرض النيوكاسل ومرض متلازمة إنفلونزا الكبد (موجة النافورة).

### محاذير الإستخدام:

يمنع تخصيص الطيور المريضة أو المجهدة.

### ردود الفعل السلبية:

نادرة: حدوث تفاعل طفيف في موضوع الحقن.

إذا لاحظت أي آثار جانبية، حتى تلك الغير

درجية في هذه النشرة أو كنت تعتقد أن اللقاح لم يعطي النتائج المرجوة، يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

### النوع المستهدف:

الدواجن.

### الجرعة:

#### • التحسين الأول:

- إحقن ٠،٢ مل لكل طير؛ تحت الجلد في أسفل الرقبة من الخلف أو في عضلة الفخذ على عمر ١٠ - ١١ أيام.

#### • الجرعة المزدوجة:

- إحقن ٠،٥ مل لكل طير؛ تحت الجلد في أسفل الرقبة من الخلف أو في عضلة الصدر أو الفخذ على عمر ٢٠ - ٢٦ أسبوع.

- اللحصول على مناعة جديدة يجب إعطاء لقاح

جي فيروس النيوكاسل قبل إعطاء اللقاح

في المبيت الزيتني.

## اسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenter.com, www.jovaccenter.com

