



# جوفا زيت ا، ٦ بلس®

لقاح زيتى معطل للحقن يحتوى على فيروس النيوكاسل (a,b) ٨,٤,٢ وفiroس الأدينو ذو النوع المصلي

**الجرعة الزائدة:**  
احتلال حدوث تفاعل طيفي في موضع الحقن في حال حقن ضعفين الترکيز من جرعة اللقاح المعتمدة.

## احتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبى بيطرى غير مستخدم أو مواد ثقابيات مشقةة من هذا المنتج الطبى البيطرى وفقاً للمطالبات المحلية.

### معلومات إضافية:

لقاح معطل زيتى ثانى. يتم تحضير الفيروس في أجنة الدجاج الحالى من الأمراض (SPF) وخلايا كبد أجنة الدجاج الحالى من الأمراض (SPF) ويتم خلطه مع المواد المساعدة لإنتاج لقاح مستحلب.

### التعبئة:

عبوات بلاستيكية سعة: ٥٠٠ مل.

## للإستعمال البيطري فقط.

• للحصول على مناعة جيدة يجب إعطاء لقاح في فيروس النيوكاسل قبل إعطاء اللقاح في المبيت الزيتى.

### نصائح طريقة الإستخدام:

- يحضر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة وعمقمة خالية من المطهرات.
- انتظر ليأخذ اللقاح درجة حرارة الغرفة قبل الاستعمال.
- رج العودة جيداً قبل الاستعمال.

### فترقة السحب: صفر يوم.

## احتياطات التخزين الخاصة:

- يحفظ مبرداً (٢٠ - ٣٠)°C.
- يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- يمنع تجمده.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح: ستة أشهر من تاريخ الإنتاج يجب إستخدام اللقاح خلال ٨ ساعات بعد فتح العبوة.

### تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأصناف المستهدفة:

تحصين البالغين الطيور السليمية فقط.

احتياطات خاصة للاستخدام في الحيوانات:

غير قابل للتطبيقات.

الاحتياطات الخاصة التي يجب اتخاذها الشخص الذي يقوم بحقن الحيوانات:

اللقاح لا يسبب مرض للإنسان ولكن يجب

الانتباه من الحقن العرضي.

في حالة حدوث الحقن العرضي، عليك مراجعة الطبيب.

### الاستخدم خلال فترة الوضع، الخطوبة:

يمكن أن يستخدم خلال فترة انتقال البيض.

التفاعل مع المستضدات الطبية الأخرى:

وشكال التفاعل الآخرين:

لا توجد معلومات متاحة حول سلامه وفعالية

هذا اللقاح عند استخدامه مع أي منتج طبى

بيطري آخر. يجب اتخاذ قرار باستخدام هذا

اللقاح قبل أو بعد استخدام أي منتج طبى

بيطري آخر كل حالة على حدة.

### بيان المادة الفعالة والمكونات

#### الأخر:

تحتوى كل جرعة (٥,٠ مل) من اللقاح على:

• المادة الفعالة:

- على الأقل  $EID_{50}$   $8,10$  من فيروس

نيوكاسل عترة لاسوتا المعدل.

- على الأقل  $TCID_{50}$   $8,4,2$  من فيروس

الأدينو المعطل ذو النوع المصلى

(موه التامور والتهاب الكبد ذو المشتقات).

• المكونات الأخرى:

سبان،  $8,0$ ، توبين،  $8,0$ ، ثايميرسال، المادة المنشطة للمناعة.

### الإحتياطيات:

لإعطاء مناعة جيدة للدواجن (اللحم والأمهات) ضد مرض النيوكاسل ومرض متلازمة

التهاب الكبد (موه التامور والتهاب الكبد ذو المشتقات).

### محاذير الإستخدام:

يمنع تحصين الطيور المريضة أو المجهدة.

### ردود الفعل السلبية:

نادرة: حدوث تفاعل طيفي في موضع الحقن.

إذا لاحظت أي آثار جانبية، حتى تلك الغير مرددة في هذه النشرة أو كنت تعتقد أن اللقاح لم يعطي النتائج المرجوة، يرجى إبلاغ الطبيب

البيطري.

### النوع المستهدف:

الدواجن.

#### الجرعة:

• الأمهات:

- التخصيب الأول: إحقن،  $5$  مل لكل طير؛ تحت الجلد في أسفل الرقبة من الخلف على عمر  $10$  أسبوع.

- التخصيب الثاني:

إحقن،  $5$  مل لكل طير؛ تحت الجلد في أسفل الرقبة من الخلف على عمر  $4$  أسبوع.

• اللامن من أمهات غير محصنة:

إحقن،  $2$  مل لكل طير؛ تحت الجلد في أسفل الرقبة من الخلف على عمر أقل من  $10$  أيام أو

إحقن،  $5$  مل لكل طير؛ تحت الجلد في أسفل الرقبة من الخلف على عمر أكبر من  $10$  أيام.

### اسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenter.com, www.jovaccenter.com