



جوفا زيت ٧، ا

لقاح زيتني معطل للحقن يحتوي على فيروس النيوكاسل وفiroس انفلونزا الطيور المنخفض الامراضية عترة (H9N2)

الاستخدم خلال فترة الوضع، الخصوبة: يمكن أن يستخدم خلال فترة انتاج البيض. القواع مع المستحضرات الطبية الأخرى: وشكال الفعالي الأخر: لا توجد معلومات متاحة حول سلامه وفعالية هذا اللقاح عند استخدامه مع أي منتج طبى H9N2. في حين وصلت الممانعة ضد NDV بعد استخدامه على مدار ١٨-٢٦ أسبوع لتعزيز الممانعة ضد بيطري آخر. يجب اتخاذ قرار باستخدام هذا اللقاح قبل أو بعد استخدام أي منتج طبى بيطري آخر كل حالة على حدة.

الجرعة الراية:
احتلال حدوث تفاعل مطفي في موضوع الحقن في حال حقن ضعفين التركيز من جرعة اللقاح المعتمدة.

احتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبى بيطري غير مستخدم أو مواد تغذيات مشتقة من هذا المنتج الطبى البيطري وفقاً للمطالبات المحلية.

معلومات اضافية:

للقاح معطل زيتني ثانوي. يتم تحضير الفيروس في أجنة الدجاج الداخلي من الأمراض (SPF) ويتم خلطه مع المواد المساعدة لإنتاج لقاح مستخلب.

التعبئة:

عبوات بلاستيكية سعة: ٣٠٠ مل، ١٥٠ جرعة عند حقن ٠٠٢ مل و ١٠٠ جرعة عند حقن ٠٠٣ مل.

للإستعمال البيطري فقط.

- الجرعة التعزيزية الثانية للأمهات والدجاج البياض:

حقن ٢،٠ مل تحت الجلد في أسفل الرقبة من الخلف أو في عضلة الصدر أو الخد من لقاح جوفا زيت ٧ على عمر ١٨-٢٦ أسبوع لتعزيز الممانعة ضد H9N2. في حين وصلت الممانعة ضد NDV إلى مستوى عالٍ بسبب التطعيم المتعدد للطيور بأنواع مختلفة من لقاحات مرض نيووكاسل الحبة والمعلقة حتى بلوغ الطيور ١٦ أسبوعاً من العمر. للحصول على ممانعة جيدة يجب إعطاء لقاح في فيروس النيوكاسل قبل إعطاء اللقاح المبكر الزيتي.

نصائح طريقة الإستخدام:

- يحدّث اللقاح باستخدام أدوات نظيفة وعقممة خالية من المطهرات.
- انتظر أياخذ اللقاح درجة حرارة الغرفة قبل الاستعمال.
- رج العبوة جيداً قبل الاستعمال.

فترقة السحب:

صفر يوم.

احتياطات التخزين الخاصة:

- يحفظ مبرداً (-٢٠°C - +٤°C).
- يُمنع بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- يُحفظ بعيداً عن تجميد.
- يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح: ستanan من تاريخ الإنتاج.
- يجب استخدام اللقاح خلال ٨ ساعات بعد فتح العبوة.

تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأصناف المساعدة:

تحسين الطيور السليمة فقط.
احتياطات خاصة لاستخدام في الحيوانات: غير قابل للتطبيقات.
الاحتياطات الخاصة التي يجب أن تأخذها الشخص الذي يقوّي ويعقم الحيوانات:
اللقالح لا يسبّب مرض للإنسان ولكن يجب الإنتباه من الحقن العرضي.
في حالة حدوث الحقن العرضي، عليك مراجعة الطبيب.

بيان المادة الفعالة والمكونات الآخرى:

يحتوي كل (٢،٠ مل) من اللقاح على:

- المادة الفعالة:
- على الأقل على ٨٠٪ من EID₅₀ من فيروس نيووكاسل عترة لاسوتا المعطل.
- على الأقل على ٨٠٪ من EID₅₀ من فيروس الانفلونزا عترة (H9N2) المعطل.
- المكونات الأخرى:
سيان، توبين، ثايموريسال، المادة المنشطة للممانعة.

الإستطبابات:

لإعطاء ممانعة جيدة للدواجن ضد مرض النيوكاسل وأنفلونزا الطيور المنخفض الامراضية عترة (H9N2).

محاذير الإستخدام:

يمنع تخصيص الطيور المريضة أو المجهدة.

ردود الفعل السلبية:

نادرة: حدوث تفاعل مطفي في موضوع الحقن. إذا لاحظت أي آثار جانبية، حتى تلك الغير مدرجة في هذه النشرة أو كنت تعتقد أن اللقاح لم يعطي النتائج المرجوة، يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

النوع المستهدف:

الدواجن.

الجرعة:

- الجرعة الأولى للأمهات والدجاج البياض واللحم:

حقن ٢،٠ مل تحت الجلد في أسفل الرقبة من الخلف أو في عضلة الخد على عمر ٧-١٠ أيام.

- الجرعة التعزيزية الأولى للأمهات والدجاج البياض:

حقن ٣،٠ مل تحت الجلد في أسفل الرقبة من الخلف أو في عضلة الصدر أو الخد على عمر ٨-٦ أسابيع.

اسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenter.com, www.jovaccenter.com