



جوفا زيت ٦ بريميوم®

لقاح زيتني معطل للحقن يحتوي على فيروس
الأدينو ذو النوع المصلي ٢,٤,٨,١١(a,b)

معلومات إضافية:

لقاح معطل زيتني. يتم تحضير الفيروس في خلايا كبد أجنة الدجاج الخام من الأمراض (SPF) ويتم خلطه مع المواد المساعدة لإنتاج لقاح مستخلب.

التعبئة:

عيوب بلاستيكية سعة: ٢٠٠ مل (١٠٠ جرعة).

للإستعماال البيطري فقط.

فترة السحب:

صفر يوم.

احتياطات التخزين الخاصة:

- يحفظ مبرداً (-٢° - ٢٠°).
- يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- يمنع تجميده.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح: ستان من تاريخ الإنتاج.
- يجب استخدام اللقاح خلال ٨ ساعات بعد فتح العبوة.

تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأصناف المستهدفة: تحسين الطيور السليمية فقط.

احتياطات خاصة للاستخدام في الحيوانات: غير قابل للتطبيق.

الاحتياطات الخاصة التي يجب اتخاذها الشخص الذي يفهم بحقن الحيوانات: اللقاح لا يسبب مرض للإنسان ولكن يجب الانتباه من الحقن العرضي. في حالة حدوث الحقن العرضي، عليك مراجعة الطبيبي.

الاستخدم طالل فترة الوضع، الخصوية:

يمكن أن يستخدم خلال فترة انتاج الطيب.

التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى:

لا توجد معلومات متاحة حول سلامه وفعالية هذا اللقاح عند استخدامه مع أي منتج طبى بيطري آخر. يجب اتخاذ قرار باستخدام هذا اللقاح قبل وبعد استخدام أي منتج طبى بيطري آخر كل حالة على حدة.

احتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبى بيطري غير مستخدم أو مواد نقابيات مشتقة من هذا المنتج الطبى البيطري وفقاً للمطالبات المحلية.

بيان المادة الفعالة والمكونات

الأخر:

- تحتوى كل جرعة من اللقاح على: المادة الفعالة: على الأقل، $TCID_{50}$ من فيروس الأدینو (١٠^٣-١٠^٤) من فيروس المصل (٨,٤,٢,١,١(a,b)).
- المعلطل ذو النوع المصلي (موه التامور والتهاب الكبد ذو المشتملات).
- المكونات الأخرى: سبان، توبين، ثايميرسال، المادة المنشطة للمناعة.

الإستطابيات:

إعطاء مناعة مناعة جيدة للدواجن ضد مرض متلازمة إلتهاب الكبد (موه التامور والتهاب الكبد ذو المشتملات).

محاذير الاستخدام:

يمنع تحسين الطيور المريضة أو المجهدة.

ردود الفعل السلبية:

نادرة: حوث تفاعل مغيف في موضع الحقن. إذا لاحظت أي آثار جانبية حتى تلك الغير مدرجة في هذه النشرة أو كنت تعتقد أن اللقاح لم يعطي النتائج المرجوة، يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

النوع المستهدف:

الدواجن.

الجرعة:

حقن، ٣، ٥ مل لكل طير: تحت الجلد في أسفل الرقبة من الخلف أو في عضلة الصدر أو عضلة الفخذ.

- التحسين الأمهات والبياضن:
- الجرعة الأولى على عمر ٨ أيام.
- الجرعة الثانية على عمر ١٤-١٢ أسبوع.

نصائح طريقة الاستخدام:

- ي مصدر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة ومعقمة خالية من المطهرات.
- انتظر لأخذ اللقاح درجة حرارة الغرفة قبل الاستعمال.
- رج العبوة جيداً قبل الاستعمال.

اسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenter.com, www.jovaccenter.com

