



# جوفاً زيت v®

لقاح زيتي معطل للحقن يحتوي على فيروس انفلونزا الطيور المنخفض الامراضية عترة (H9N2)

## بيان المادة الفعالة والمكونات الأخرى:

- يحتوي كل (٠,٢ مل) من اللقاح على:
- المادة الفعالة:
- على الأقل  $10^{6.0}$  EID<sub>50</sub> من فيروس انفلونزا الطيور عترة (H9N2) المعطل.
- المكونات الأخرى:
- سبان ٨٠، تويين ٨٠، ثايوميرسال، المادة المنشطة للمناعة.

## الإستطبيات:

لإعطاء مناعة جيدة للدواجن ضد مرض انفلونزا الطيور المنخفض الامراضية عترة (H9N2).

## مخادير الإستخدام:

يمنع تحصين الطيور المريضة أو المجهدة.

## ردود الفعل السلبية:

نادرة: حدوث تفاعل لطيف في موضع الحقن. إذا لاحظت أي آثار جانبية، حتى تلك الغير مدرجة في هذه النشرة أو كنت تعتقد أن اللقاح لم يعطي النتائج المرجوة، يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

## النوع المستهدف:

الدواجن.

## الجرعة:

- الجرعة الأولى للأمهات والدجاج البيض واللاحم:
- إحقتن ٠,٢ مل تحت الجلد في أسفل الرقبة من الخلف أو في عضلة الفخذ على عمر ٧-١ أيام.
- الجرعة التعزيزية الأولى للأمهات والدجاج البيض:
- إحقتن ٠,٢ مل تحت الجلد في أسفل الرقبة من الخلف أو في عضلة الصدر أو الفخذ على عمر ٨-٦ أسابيع.
- الجرعة التعزيزية الثانية للأمهات والدجاج البيض:
- إحقتن ٠,٢ مل تحت الجلد في أسفل الرقبة من الخلف أو في عضلة الصدر أو الفخذ على عمر ١٦-١٨ أسبوع.

- من الممكن التحصين على عمر ٤٠ أسبوع لتعزيز نقل الأجسام المناعية الأمية إلى الصيصان الفاقسة.

## نصائح طريقة الإستخدام:

- يحضر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة ومعقمة خالية من المطهرات.
- انتظر ليأخذ اللقاح درجة حرارة الغرفة قبل الاستعمال.
- رج العبوة جيدا قبل الاستعمال.

## فترة السحب:

صفر يوم.

## إحتيانات التخزين الخاصة:

- يحفظ مبردا (٢°م - ٨°م).
- يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.
- يمنع تجميده.
- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح: سنتان من تاريخ الإنتاج.
- يجب إستخدام اللقاح خلال ٨ ساعات بعد فتح العبوة.

## تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأنصاف المستهدفة:

تحصين الطيور السليمة فقط.

إحتيانات خاصة للاستخدام في الحيوانات:

غير قابل للتطبيق.

الإحتيانات الخاصة التي يجب أخذها الشخص الذي يقوم بحقن الحيوانات:

لللقاح لا يسبب مرض للإنسان ولكن يجب الإلتباه من الحقن العرضي.

في حالة حدوث الحقن العرضي، عليك مراجعة الطبيب.

الإستخدام خلال فترة الوضع، الخصوبة:

يمكن أن يستخدم خلال فترة إنتاج البيض.

التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى

وأشكال التفاعل الأخرى:

لا توجد معلومات متاحة حول سلامة وفعالية هذا اللقاح عند استخدامه مع أي منتج طبي بيطري آخر. يجب اتخاذ قرار باستخدام هذا اللقاح قبل أو بعد استخدام أي منتج طبي بيطري آخر كل حالة على حدة.

## الجرعة الزائدة:

احتمال حدوث تفاعل لطيف في موضع الحقن في حال حقن ضعفين التركيز من جرعة اللقاح المعتمدة.

## إحتيانات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبي بيطري غير مستخدم أو مواد نفايات مشتقة من هذا المنتج الطبي البيطري وفقاً للمتطلبات المحلية.

## معلومات إضافية:

لقاح معطل زيتي أحادي. يتم تحضير الفيروس في أجنة الدجاج الخالي من الأمراض (SPF) ويتم خلطه مع المواد المساعدة لإنتاج لقاح مستحلب.

## التعبئة:

عبوات بلاستيكية سعة: ٢٠٠ مل:

١٥٠٠ جرعة عند حقن ٠,٢ مل و

١٠٠٠ جرعة عند حقن ٠,٣ مل.

## لإستعمال البيطري فقط.

## إسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenr.com, www.jovaccenr.com

Jovac