



جوفاً زيت H5N8®

لقاح زيتي معطل للحقن يحتوي على فيروس انفلونزا الطيور المنخفض الامراضية عترة (H5N8)

بيان المادة الفعالة والمكونات الأخرى:

- يحتوي كل (٠,٢٥ مل) من اللقاح على:
- المادة الفعالة:
- على الأقل $EID_{50}^{A/10}$ من فيروس انفلونزا الطيور عترة (H5N8) المعطل.
- المكونات الأخرى:
- سبان ٨٠، تويين ٨٠، ثايوميرسال، المادة المنشطة للمناعة.

الإستطبيات:

لإعطاء مناعة جيدة للدواجن ضد مرض انفلونزا الطيور المنخفض الامراضية عترة (H5N8).

مخاذي الإستخدام:

يمنع تحصين الطيور المريضة أو المجهدة.

ردود الفعل السلبية:

نادرة: من الممكن حدوث تفاعل طفيف. إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

النوع المستهدف:

الدواجن.

الجرعة:

- الدجاج اللاحم:
- إحقن ٠,٢٥ مل تحت الجلد في أسفل الرقبة من الخلف أو في عضلة الفخذ على عمر ٧-١ أيام.
- الدجاج البياض والأمهات:
- الجرعة الأولى: إحقن ٠,٢٥ مل تحت الجلد في أسفل الرقبة من الخلف أو في عضلة الفخذ على عمر ٧-١ أيام.
- الجرعة الثانية: إحقن ٠,٥ مل تحت الجلد في أسفل الرقبة من الخلف أو في عضلة الصدر أو الفخذ على عمر ٦-٨ أسابيع.
- الجرعة الثالثة: إحقن ٠,٥ مل تحت الجلد في أسفل الرقبة من الخلف أو في عضلة الصدر أو الفخذ قبل الوضع.

نصائح طريقة الإستخدام:

- يحضر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة ومعقمة خالية من المظهرات.
- انتظر ليأخذ اللقاح درجة حرارة الغرفة قبل الاستعمال.
- رج العبوة جيدا قبل الاستعمال.

فترة السحب:

صفر يوم.

إحتياجات التخزين الخاصة:

- يخفظ مبردا (٢م° - ٨م°).
- يخفظ بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.
- يمنع تجميده.
- يخفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح: سنتان من تاريخ الإنتاج.
- يجب إستخدام اللقاح خلال ٨ ساعات بعد فتح العبوة.

معلومات إضافية:

لقاح معطل زيتي أحادي. يتم تحضير الفيروس في أجنة الدجاج الخالي من الأمراض (SPF) ويتم خلطه مع المواد المساعدة لإنتاج لقاح مستحلب.

التعبئة:

عبوات بلاستيكية سعة: ٥٠٠ مل.

لإستعمال البيطري فقط.

تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأصناف

المستهدفة:

تحصين الطيور السليمة فقط.

احتياطات خاصة للإستخدام في الحيوانات:

غير قابل للتطبيق.

الاحتياطات الخاصة التي يجب أخذها الشخص

الذي يقوم بحقن الحيوانات:

اللقاح لا يسبب مرض للإنسان و لكن يجب

الإنتباه من الحقن العرضي.

في حالة حدوث الحقن العرضي، عليك مراجعة

الطبيب.

الإستخدام خلال فترة الوضع، الخصوبة:

يمكن أن يستخدم خلال فترة إنتاج البيض.

التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى

وأشكال التفاعل الأخرى:

لا توجد معلومات متاحة حول سلامة وفعالية

هذا اللقاح عند استخدامه مع أي منتج طبي

بيطري آخر. يجب اتخاذ قرار باستخدام هذا

اللقاح قبل أو بعد استخدام أي منتج طبي

بيطري آخر كل حالة على حدة.

الجرعة الزائدة:

إحتمال حدوث تفاعل طفيف في حال حقن

ضعفي التركيز من جرعة اللقاح المعتمدة.

إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب

البيطري.

إحتياطات خاصة للتخلص من بقايا

اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبي بيطري غير

مستخدم أو مواد نفايات مشتقة من هذا المنتج

الطبي البيطري وفقاً للمتطلبات المحلية.

إسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenr.com, www.jovaccenr.com

Jovac