



جوفاكلوست ت[®]

لقاح معطل معلق للحقن
مضاد للأمراض الكلوستريرية

بيان المادة الفعالة والمكونات الأخرى:

- المادة الفعالة:
- كل جرعة تحتوي على كمية كافية من السوموم المعطلة والبكتيريا الميتة المنتجة لسوموم: كلوستريديم بيرفرنجنز نوع (A, B, C & D) ≤ ١٠ وحدة دولية مضاد لسوموم ألفا، ≤ ٥ وحدات دولية مضاد لسوموم بيتا، ≤ ٥ وحدات دولية مضاد لسوموم إبسيلون، كلوستريديم سيبتيكوم ≤ ٢,٥ وحدة دولية مضاد لسوموم ألفا، كلوستريديم نوفيواي نوع (A & B) ≤ ٣,٥ وحدة دولية مضاد لسوموم ألفا، كلوستريديم تيتاني (كراز) ≤ ٢,٥ وحدة دولية مضاد لسوموم الكراز، كلوستريديم سورديلي ≤ ١ وحدة دولية مضاد لسوموم سورديلي، كلوستريديم هيموليتيكوم (نوفيواي نوع D) حماية ≤ ٨٠٪، كلوستريديم شوفيواي حماية ≤ ٩٠٪.
- المكونات الأخرى:
- هيدروكسيد الألمنيوم: > ٤ ملغم / مل.

إحتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:
يجب التخلص من أي منتج طبي بيطري غير مستخدم أو مواد نفايات مشتقة من هذا المنتج الطبي البيطري وفقاً للمتطلبات المحلية.

معلومات إضافية:

لقاح كلوستريديم معطل متعدد التكافؤ لحماية الأبقار، الأغنام، الماعز، الإبل ضد الأمراض الكلوستريرية والتي تنتسب في نفوق الحيوانات المفاجئ. وبشكل عام فإن الوقاية من المرض يعتمد على الرعاية الصحية السليمة و التحصين بواسطة اللقاح.

التعبئة:

عبوات بلاستيكية سعة: ٥٠، مل، ١٠٠، مل، ٢٥٠، مل، ٥٠٠، مل.

للإستخدام البيطري فقط.

- تحصين حيثي الولادة:
- في الأغنام و الماعز:

- إذا كانت من أمهات غير محصنة: تحصن بجرعتين الأولى على عمر أكبر من شهر والثانية بعد ١٢-١٤ أسابيع من التحصين الأول.
- إذا كانت من أمهات محصنة: تحصن بجرعتين الأولى على عمر ٧-٨ أسابيع والثانية بعد ٣-٤ أسابيع من التحصين الأول، لكي لا تتعارض مع الأجسام المناعية المنقولة من الأم.
- في صغار الأبقار و الإبل:
- تحصن بجرعتين الأولى على عمر ٣ شهور والثانية بعد ٤-٢ أسابيع من التحصين الأول.

نصائح طريقة الإستخدام:

- رج اللقاح جيداً قبل الإستخدام.
- استخدم إجراءات التعقيم المعتادة.
- تجنب إجهاد الحيوان عند التطعيم.

فترة السحب:

صفر يوم.

إحتياطات التخزين الخاصة:

- يحفظ ميردا (٢٠°م - ٨°م).
- يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- يمنع تجميده.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح بعد فتح العبوة: يجب إستخدام اللقاح خلال ٨ ساعات من فتح العبوة.
- صلاحية اللقاح: سنتان من تاريخ الإنتاج.

تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأصناف

المستهدفة:

تحصين الحيوانات السليمة فقط.

إحتياطات خاصة للإستخدام في الحيوانات:

غير قابل للتطبيق.

الإحتياطات الخاصة التي يجب أخذها الشخص

الذي يقوم بحقن الحيوانات:

اللقاح لا يسبب مرض للإنسان و لكن يجب الإنتباه من الحقن العرضي.

في حالة حدوث الحقن العرضي ، عليك مراجعة الطبيب.

الإستخدام خلال فترة الحمل، الرضاعة، الخصوبة:

يمكن أن يستخدم خلال فترة الحمل، الرضاعة، موسم التكاثر.

التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى

وأشكال التفاعل الأخرى:

لا توجد معلومات متاحة حول سلامة وفعالية هذا اللقاح عند استخدامه مع أي منتج طبي بيطري آخر. يجب إتخاذ قرار باستخدام هذا اللقاح قبل أو بعد استخدام أي منتج طبي بيطري آخر كل حالة على حدة.

الجرعة الزائدة:

عند حقن جرعتين من جرعة اللقاح المعتمدة:

نادرة جداً: في حال حدوث ردة فعل تحسسي للحيوان نتيجة التحصين ينبغي الحصول على المشورة البيطرية.

إسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenr.com, www.jovaccenr.com

Jovac