



جوفاك باست®

لقاح معطل معلق للحقن
مضاد لمرض الباستوريلا

بيان المادة الفعالة والمكونات الأخرى:

- المادة الفعالة:
كل جرعة تحتوي على كمية كافية من السوموم المعطلة والبكتيريا الميتة المنتجة لسوموم: باستوريلا ملتوسيدا عترة (A:1,3/B:2,5/D:4) المعطلة حماية على الأقل $2 \log_{10}$ لكل عترة ومنهيميا هيموليتيكا نوع A1 المعطلة حماية على الأقل $1 \log_{10}$.
- المكونات الأخرى:
هيدروكسيد الألمنيوم: > 4 ملغم / مل.

الإستبيبات:

- يستعمل لقاح جوفاك باست للوقاية من مرض الباستوريلا في الحيوانات المجترة (الأبقار، الإبل، الأغنام، الماعز).
- بدء الإستجابة المناعية: بعد (٢ يومًا).
- مدة الحماية المناعية: على الأقل سنة.

مخاطر الإستخدام:

يمنع تحصين الحيوانات المريضة أو المجهدة.

ردود الفعل السلبية:

- نادرة جدا، في حال حدوث ردة فعل تحسسي للحيوان نتيجة التحصين ينبغي الحصول على المشورة البيطرية.
- إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

الأصناف المستهدفة:

الأغنام، الماعز، الأبقار، الجمال.

الجرعة:

- يحقن اللقاح تحت الجلد، ويفضل في منطقة الإبط للأطراف الأمامية الخالية من الشعر بالنسبة للأغنام و الماعز و منطقة الرقبة أمام الكتف مباشرة بالنسبة للأبقار و الإبل كالتالي:
حديتي الولادة والحملان: ١ مل
الأغنام و الماعز : ٢ مل
الأبقار و الإبل: ٥ مل

تحصين الحيوانات الكبيرة:

- التحصين الأول: تحصن بجرعتين الأولى على أي عمر والثانية بعد ٤-٦ أسابيع من التحصين الأول.
- التحصين الثاني: تحصن بجرعة واحدة سنويًا، ويفضل ٢-٣ أسابيع قبل بداية الولادات في القطيع للتأكد من الحصول على مستوى جيد من المناعة.

التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى وأشكال التفاعل الأخرى:

لا توجد معلومات متاحة حول سلامة وفعالية هذا اللقاح عند استخدامه مع أي منتج طبي بيطري آخر. يجب اتخاذ قرار باستخدام هذا اللقاح قبل أو بعد استخدام أي منتج طبي بيطري آخر كل حالة على حدة.

الجرعة الزائدة:

عند حقن جرعتين من جرعة اللقاح المعتمدة: نادرة، في حال حدوث ردة فعل تحسسي للحيوان نتيجة أو مواد نفايات مشتقة من هذا المنتج الطبي البيطري. التحصين ينبغي الحصول على المشورة البيطرية.

إحتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبي بيطري غير مستخدم أو مواد نفايات مشتقة من هذا المنتج الطبي البيطري وفقًا للمتطلبات المحلية.

معلومات إضافية:

لقاح معطل متعدد التكافؤ لحماية الأبقار، الأغنام، الماعز، الإبل ضد مرض الباستوريلا والتي تتسبب في نفوق الحيوانات المفاجئ. وبشكل عام فإن الوقاية من المرض يعتمد على الرعاية الصحية السليمة و التحصين بواسطة اللقاح.

التعبئة:

عبوات بلاستيكية سعة: ٥٠ مل، ١٠٠ مل، ٢٠٠ مل، ٢٥٠ مل.

للإستخدام البيطري فقط.

تحصين حديتي الولادة:

- في الأغنام و الماعز:

- إذا كانت من امهات غير محصنة: تحصن بجرعتين الأولى على عمر أكبر من شهر والثانية بعد ٨-١٢ أسابيع من التحصين الأول.

- إذا كانت من امهات محصنة: تحصن بجرعتين الأولى على عمر ٧-٨ أسابيع والثانية بعد ٢-٤ أسابيع من التحصين الأول، لكي لا تتعارض مع الأجسام المناعية المنقولة من الأم.

- في صغار الأبقار و الإبل:

- تحصن بجرعتين الأولى على عمر ٣ شهور والثانية بعد ٢-٤ أسابيع من التحصين الأول.

طريقة الإستخدام:

- رج اللقاح جيدا قبل الإستخدام.
- استخدم إجراءات التعقيم المعتادة.
- تجنب إجهاد الحيوان عند التطعيم.

فترة السحب:

صفر يوم.

إحتياطات التخزين الخاصة:

- يحفظ مبردا (٢م° - ٨م°).
- يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.
- يمنع تجميده.
- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح بعد فتح العبوة: يجب إستخدام اللقاح خلال ٨ ساعات من فتح العبوة.
- صلاحية اللقاح: سنتان من تاريخ الإنتاج.

تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأصناف

المستهدفة:

تحصين الحيوانات السليمة فقط.

إحتياطات خاصة للإستخدام في الحيوانات:

غير قابل للتطبيق.

الإحتياطات الخاصة التي يجب أخذها الشخص

الذي يقوم بحقن الحيوانات:

اللقاح لا يسبب مرض للإنسان و لكن يجب الإنتباه من الحقن العرضي.
في حالة حدوث الحقن العرضي ، عليك مراجعة الطبيب.
الإستخدام خلال فترة الحمل، الرضاعة، الخصوبة:
يمكن أن يستخدم خلال فترة الحمل، الرضاعة، موسم التكاثر.

إسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenr.com, www.jovaccenr.com

Jovac