



جوفابلازم سي®

لقاح معطل معلق للحقن
مضاد لمرض التهاب جنب ذات الرئة المعدي

بيان المادة الفعالة والمكونات الأخرى:

- المادة الفعالة:
 - كل جرعة من اللقاح تحتوي على الأقل على ٠,١٥ ملغم من مايكوبلازما كاريي كولوم من النوع الفرعي كاريي نيومونيا (MCCP)، المعروفة سابقاً بعترة (F38).
- المكونات الأخرى:
 - السابونين.

الإستبيات:

يستعمل هذا اللقاح لتلقيح الماعز ضد مرض التهاب جنب ذات الرئة المعدي.

محاذير الإستخدام:

يمنع تحصين الحيوانات المريضة أو المجهدة.

ردود الفعل السلبية:

نادرة جداً، من المحتمل تكون كتلة صغيرة جداً أن تظهر في موقع الحق من الحيوانات الملقحة تخففي عادة في غضون ٤٨ ساعة.
إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

الأصناف المستهدفة:

الماعز.

الجرعة:

- إحفن جرعة واحدة من اللقاح (١ مل) لكل حيوان تحت الجلد، (و يفضل في منطقة الإبط للأطراف الأمامية الخالية من الشعر على عمر ٣ شهور و أكبر).
- يعاد التحصين بجرعة معتمدة واحدة (١ مل) لكل حيوان كل ٦ أشهر دورياً.
- التحصين الروتيني للماعز أكبر من ٣ أشهر من العمر، في حالة تفشي المرض يمكن تلقيح الحيوانات من عمر شهرين.
- ينصح وبشدة تحصين الماعز السليم في المناطق الموبوءة والمناطق عالية الخطورة.
- التحصين الروتيني للماعز أكبر من ٣ أشهر من العمر.

طريقة الإستخدام:

- رج اللقاح جيداً قبل الإستخدام.
- استخدم إجراءات التعقيم المعتادة.
- تجنب إجهاد الحيوان عند التطعيم.

فترة السحب:

صفر يوم.

إحتياطات التخزين الخاصة:

- يحفظ ميردا (٢م° - ٨م°).
- يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- يمنع تجميده.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح بعد فتح العبوة: يجب إستخدام اللقاح خلال ٨ ساعات من فتح العبوة.
- صلاحية اللقاح: سنتان من تاريخ الإنتاج.

تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأصناف

المستهدفة:

تحصين الحيوانات السليمة فقط.

إحتياطات خاصة للإستخدام في الحيوانات:

غير قابل للتطبيق.

الإحتياطات الخاصة التي يجب أخذها الشخص

الذي يقوم بحقن الحيوانات:

اللقاح لا يسبب مرض للإنسان ولكن يجب الإبتناء من الحقن العرضي.

في حالة حدوث الحقن العرضي ، عليك مراجعة الطبيب.

الإستخدام خلال فترة الحمل، الرضاعة، الخصوبة:

يمكن استخدامه أثناء الحمل، الرضاعة، موسم التكاثر.

التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى

وأشكال التفاعل الأخرى:

لا توجد معلومات متاحة حول سلامة وفعالية هذا اللقاح عند استخدامه مع أي منتج طبي بيطري آخر. يجب

اتخاذ قرار باستخدام هذا اللقاح قبل أو بعد استخدام أي منتج طبي بيطري آخر كل حالة على حدة.

الجرعة الزائدة:

عند حقن جرعتين من جرعة اللقاح المعتمدة:

نادرة: من المحتمل تكون كتلة صغيرة جداً أن تظهر

في موقع الحق من الحيوانات الملقحة تخففي عادة في غضون ٤٨ ساعة.

إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

إحتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبي بيطري غير مستخدم أو مواد نفايات مشتقة من هذا المنتج الطبي البيطري وفقاً للمتطلبات المحلية.

معلومات إضافية:

يعتبر مرض التهاب جنب ذات الرئة المعدي من أهم وأخطر الأمراض التي تصيب الماعز. حيث تسبب

الأمراضية تتراوح ما بين ٨٠-١٠٠٪ والنفوق ما بين ٦٠-٨٠٪ ويصبح الحيوان مريض وضعيف والنهائية

النفوق، إن المسبب للمرض هو ميكروب المايكوبلازما الماعزي (*Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae*).

إن السيطرة على المرض هو بواسطة إستعمال اللقاح

جوفابلازم سي.

التعبئة:

عبوات بلاستيكية سعة: ٥٠ مل، ١٠٠ مل.

لإستخدام البيطري فقط.

إسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccen.com, www.jovaccen.com

Jovac