



جوفاسالم® E

لقاح زيتي معطل يحتوي على ميكروب
السالمونيلا إنترتيديس

مآذير الإستخدام:

يمنع تحصين الطيور المريضة أو المجهدة.

التأثيرات الجانبية:

التحصين لا يسبب ردود فعل جهازية. قد يظهر تورم بسيط في مكان الحقن كردة فعل للقاح: في معظم الحالات يختفي هذا في غضون ٢-٣ أيام.

إحتياجات خاصة:

يحضر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة ومعقمة خالية من المطهرات.

التخزين و فترة الصلاحية:

- يحفظ على درجة حرارة +٢م° إلى +٨م°، بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.
- يمنع التجميد.
- صلاحية اللقاح سنتان من تاريخ الإنتاج في ظروف التخزين الموصى بها.
- يجب إستخدام اللقاح خلال ٨ ساعات بعد فتح العبوة.

التعبئة:

عبوات بلاستيكية سعة: ٣٠٠ مل (١٠٠٠ جرعة).

للإستعمال البيطري فقط.

تعتبر السالمونيلا إنترتيديس من الميكروبات التي تسبب خمج دموي في الدواجن و في نفس الوقت تعتبر من أهم الأمراض المشتركة التي تنتقل إلى الإنسان.

التركيب:

- تحتوي كل جرعة من اللقاح على:
• على الأقل 1×10^9 CFU من ميكروب السالمونيلا إنترتيديس PT4 المعطل.
- المادة المنشطة للمناعة.

الإستطببات:

لقاح معطل زيتي أحادي لتلقيح الدواجن ضد السالمونيلا إنترتيديس ومن أجل حماية الأعضاء الداخلية خاصة المبيض والأمعاء ومنع تمرکز ميكروبا السالمونيلا فيها خوفا من إنتقال الميكروب إلى الإنسان المستهلك للبيض واللحم.

الجرعة و طريقة الإستخدام:

- انتظر ليأخذ اللقاح درجة حرارة الغرفة قبل الإستعمال.
- رج الزجاجة جيدا قبل الإستعمال.
- التحصين: إحقن جرعة واحدة لكل طير؛ ٣، ٠، ٣ مل تحت الجلد في أسفل الرقبة من الخلف كما يلي:
- الدجاج البياض: على عمر ١٠-١٢ أسبوع و ينصح بإعادة التحصين بعد ٤-٦ أسابيع من التحصين الأول.
- الأمهات: للحصول على مناعة جيدة يجب إعطاء الطيور لقاح (Galovac 9 R) الحي على عمر ٦-٨ أسابيع و على عمر ١٤ أسبوع، وإعطاء اللقاح المعطل الزيتي على عمر ١٦-١٨ أسبوع.

فترة السحب:

صفر يوم.